

| | | | | |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 3 | 4403 | Κόλλα σύγκλισης δέρματος αποστειρωμένη από γείγγα 90% V-Βουτυλο και 10% 2 οκτυλοκυανοακρλικού εστέρα. Να διατηρείται μέχρι 18 μήνες σε συσκευασία 0,35gr με ειδικά πτερύγια με άσηπτη εφαρμογή | TMX | 25 |
| 4 | 13008 | Κόλλα σύγκλισης δέρματος αποστειρωμένη από γείγγα 90% V-Βουτυλο και 10% 2 οκτυλοκυανοακρλικού εστέρα. Να διατηρείται μέχρι 18 μήνες σε συσκευασία 0,5gr με ειδικά πτερύγια με άσηπτη εφαρμογή | TMX | 20 |
| 13 | 5405 | Ανοξειδωτα βελονοκατόχων MAYO-HEGAR μήκους 140mmγια τη συρραφή και στερέωση καθετήρων αιμοκάθαρσης καθώς και για τυχόν κοπή ραμμάτων από άλλες επεμβάσεις στους αιμοκαθαιρόμενους | TMX | 20 |
| 27 | | ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ – ΚΙΤ λήψης δειγμάτων αποτελούμενα από: | | |
| 27 α | 135476 | στειλεό με άξονα από αλουμίνιο ή πλαστικό και άκρο(βύσμα) από συνθετικό υλικό(π.χ. πολυεστέρα ή Darkon).Όχι βαμβακοφόροι στείλεοί. Και στις δύο περιπτώσεις το στέλεχος του στείλεού θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει ειδική εγκοπή από τον κατασκευαστή για εύκολη κατάτμιση από τον χρήστη, χωρίς την ανάγκη χρήσης οποιοδήποτε κοπτικού μέσου. | TMX | 200 |
| 27β | 135351 | αποστειρωμένο συνοδό σωληνάριο που να περιέχει ειδικό υλικό μεταφοράς και συντήρησης ιών, είτε σε μορφή εμποτισμένου συνθετικού υφάσματος / σπόγγου, είτε στη μορφή υγρού διαλύματος > 2ml. | TMX | 200 |